

Pseudo-vogelpest/ Paramyxovirus/ N.C.D.

Enkele jaren geleden werd er een totaal vervoersverbod van vogels en pluimvee afgekondigd. Dat speelde zich allemaal af aan het begin van het tentoonstellingsseizoen. Heel vogelend Nederland stond ineens op zijn achterste benen. Geen t.t. Hoe moet dit nu verder? Deze problemen van de pseudo-vogelpest kan wellicht iedere liefhebber zich nog goed herinneren.

Wat houdt pseudo-vogelpest voor ons vogel liefhebbers eigenlijk in? Deze gevreesde ziekte kan bij o.a. pluimvee kromsnavel en tropische vogels explosief huishouden. De vogels kunnen zowel binnen als buiten de volière deze ziekte krijgen of overbrengen. Vogels vallen onder dezelfde wettelijke bepalingen als pluimvee. Zo gauw er een geval van pseudo vogelpest bekend is, wordt er in een cirkel van enkele kilometers een vervoersverbod ingesteld. Het zieke en besmette pluimvee en vogelbestanden wordt in zijn geheel vernietigd. Dit geldt ook voor de mest van de getroffen bedrijven.

Pseudo vogelpest wordt veroorzaakt door een virus en kan zich daarom gemakkelijk via het individu, via de mest of de wind verspreiden. Na een incubatietijd van 3 tot 6 dagen worden de vogels loom, ze eten niet meer en krijgen ademhalingsstoornissen. Ook treden er verlamingsverschijnselen op.

Voor duiven en pluimvee is er entstof ontwikkeld en kan er vooraf ingegrepen worden. Voor onze vogels moeten de meeste stammen van het virus het zonder geschikte entstof doen. Daarom kan het onder vogels wel eens voorkomen. In liefhebbers kringen wordt deze gevreesde ziekte dan ook meestal verzwegen.

Bij onze vogels hebben we te maken met het paramyxovirus no.3 ook wel draainek ziekte genoemd hetgeen nog weleens voorkomt bij onze neophema's en bij de tropenliefhebbers de gouldamandines. Het algemene beeld is ziek zijn gevolgd door zenuwsymptomen en ademhalingsmoeilijkheden. Veelal zal er, het kenmerkende voor deze ziekten, de witte diarree optreden of ontstoken ogen optreden. In een later stadium gaan de kopjes scheef staan.

Preventie: Aangestoken vogels en alle nog niet zieke vogels uit dezelfde kweekkooi direct verwijderen, tevens de ontlasting zonder stofvorming opruimen.

En zij het niet specifiek voor deze virus een enting te overwegen met een ander P.V.M. entstof (duiven formuleren).